

Alergil Pet

Antihistamínico - Antialérgico

Cetirizina 5 mg - 10 mg



ALERGIL PET 5MG

FÓRMULA

Cada comprimido de 250 mg contiene:

Cetirizina.....5,00 mg

Agentes de formulación c.s

DESCRIPCIÓN

Alergil pet es un agente anhistamínico bloqueante de receptores H1. Con efecto directo inhibitor de la producción de histamina en procesos alérgicos. Presentado en comprimidos birranurados que facilitan su dosificación.

INDICACIONES

Indicado como coadyuvante en el tratamiento de patologías pruríticas mediadas por histamina en perros y gatos.

También indicado como adyuvante en el tratamiento de la rinosinusitis crónica no reactiva y dermatopatías eosinofílicas en felinos.

ESPECIES

Caninos y felinos.

ADMINISTRACIÓN

Vía oral

DOSIFICACIÓN

Caninos: En Dermatitis atópica:

Tratamiento 1: administrar 1 comprimido de 250 mg cada 5 kg de peso vivo (corresponde a administrar 1 mg/kg de peso) cada 24 hs.

Tratamiento 2: 1 a 2 comprimidos de 250 mg (corresponde a administrar 5 a 10 mg totales) cada 24 hs. En dermatitis alérgica, administrar 1 comprimido de 250 mg cada 5 kg de peso (corresponde a administrar 1 mg/kg) cada 12 hs.

Felinos: Para el tratamiento adyuvante de la rinosinusitis crónica no reactiva y dermatopatías eosinofílicas, administrar 1 comprimido por animal (corresponde a administrar 5 mg totales) cada 12 hs.

En tratamiento adjunto del prurito, dosificar a razón de ½ a 1 comprimido de 250 mg por animal (corresponde a administrar 2,5 a 5 mg totales) una vez al día.

La duración del tratamiento va a depender de la gravedad del caso. Se sugiere un tratamiento de 10 a 15 días y evaluar la continuación del mismo según criterio del profesional actuante.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

No utilizar en pacientes que presentan hipersensibilidad al principio activo u otros antihistamínicos de su clase.

El uso concurrente con depresores del S.N.C puede potenciar los efectos depresores sobre el mismo.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-3330160

PRESENTACIÓN

Estuche conteniendo blísteres con 10 y 100 comprimidos de 250 mg.

CONSERVACIÓN

Conservar entre 15 y 30°C al abrigo de la luz.

ALERGIL PET 10MG

FÓRMULA

Cada comprimido de 500 mg contiene:

Cetirizina.....10,00 mg

Agentes de formulación c.s

DESCRIPCIÓN

Alergil pet es un agente anhistamínico bloqueante de receptores H1. Con efecto directo inhibitor de la producción de histamina en procesos alérgicos. Presentado en comprimidos birranurados que facilitan su dosificación.

INDICACIONES

Indicado como coadyuvante en el tratamiento de patologías pruríticas mediadas por histamina en perros y gatos.

También indicado como adyuvante en el tratamiento de la rinosinusitis crónica no reactiva y dermatopatías eosinofílicas en felinos.

ESPECIES

Caninos y felinos.

ADMINISTRACIÓN

Vía oral

DOSIFICACIÓN

Caninos: En Dermatitis atópica:

Tratamiento 1: administrar 1 comprimido de 500 mg cada 10 kg de peso vivo (corresponde a administrar 1 mg/kg de peso) cada 24 hs.

Tratamiento 2: administrar ½ a 1 comprimido 500 mg por animal (corresponde a administrar 5 a 10 mg totales) cada 24 hs.

En dermatitis alérgica: administrar 1 comprimido de 500 mg cada 10 kg de peso (corresponde a administrar 1mg/kg) cada 12 hs.

Felinos: Para el tratamiento de la rinosinusitis crónica no reactiva y dermatopatías eosinofílicas, administrar ½ comprimido de 500 mg (corresponde a administrar 5 mg totales) cada 12 hs.

En tratamiento adjunto del prurito, dosificar a razón de ¼ a ½ comprimido de 500 mg (corresponde a administrar 2,5 a 5 mg totales) una vez al día.

La duración del tratamiento va a depender de la gravedad del caso. Se sugiere un tratamiento de 10 a 15 días y evaluar la continuación del mismo según criterio del profesional actuante.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

No utilizar en pacientes que presentan hipersensibilidad al principio activo u otros antihistamínicos de su clase.

El uso concurrente con depresores del S.N.C puede potenciar los efectos depresores sobre el mismo.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-3330160

PRESENTACIÓN

Estuche conteniendo blísteres con 10 o 100 comprimidos de 500 mg.

CONSERVACIÓN

Conservar entre 15 y 30°C al abrigo de la luz.