

Antiparasitario Interno Oral

Levamisol 2,8%

Piperazina 22%



FÓRMULA

Levamisol Clorhidrato..... 2,80 g

Piperazina Diclorhidrato..... 22,00 g

Metil Bromuro de Homatropina..... 0,12 g

Agua destilada y Aromatizantes c.s.p. 100 ml

DESCRIPCIÓN

Gotas orales contra parásitos internos.

INDICACIONES

El antiparasitario interno oral actúa en parasitosis por áscaris y ancylostomas. Controlando formas adultas e inmaduras.

El producto posee una combinación de medicamentos (Bromuro de Homatropina) altamente efectiva y que minimiza la posibilidad de efectos colaterales (vómitos, hipersalivación).

ESPECIES

Caninos y felinos.

VIA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

DOSIFICACIÓN

Caninos: 0,5 ml (10 gotas) por kg. de peso.

Felinos: 0,25 ml (5 gotas) por kg. de peso.

Modo de empleo: Si bien no es imprescindible, se sugiere administrarlo en ayunas repitiendo a los 14 días.

En parasitosis severas puede repetirse a las 24 hs.

En cachorros se aconseja administrar cada 7 días, desde los 15 días de vida hasta el destete.

CONTRAINDICACIONES

Utilizar con cautela en animales debilitados.

PRESENTACIÓN

Frasco gotero de 20 ml.

Oral Parasiticide for Internal Use

Levamisole 2,8%

Piperazine 22%



COMPOSITION

Per 100 ml:

Levamisole Hydrochloride	2.80 g
Piperazine dihydrochloride	22.00 g
Homatropine methyl bromide	0.12 g
Distilled water, perfume q.s. ad	100.00 ml

DESCRIPTION

Oral drops for the control of internal parasites.

The treatment applies to the following species:

Cats and dogs.

INDICATIONS

Control of giant roundworm (ascaris) and hookworm (ncylostoma). Kills adults, larvae and eggs.

ROUTE OF ADMINISTRATION

Oral.

DOSAGE

Dogs: 0.5 ml per kilo (approximately 10 drops)

Cats: 0.25 ml per kilo (approximately 5 drops)

Repeat treatment every 2 weeks. In severe cases, treatment can be repeated in 24 hours.

CONTRAINDICATIONS

The product does not have any known contraindications or restrictions of use at the recommended doses.

HOW SUPPLIED

Drop dispenser bottle, 20 ml.