

Atropina

Atropina 1%



FÓRMULA

Atropina sulfato..... 1.00 g
Cloruro de benzalconio..... 0.01 g
Vehículo c.s.p. 100 ml

DESCRIPCIÓN

La Atropina colirio es un agente anticolinérgico con acción ciclopléjica y midriática. Su efecto midriático permite dilatar la pupila para la evaluación, diagnóstico y alivio del dolor de diferentes alteraciones oculares. Su acción ciclopléjica permite la parálisis de músculos ciliares del ojo para realizar cirugías o exploraciones oftalmológicas.

INDICACIONES

Colirio para uveítis. Ulcera de córnea. Observación de fondo de ojo.

ESPECIES

Caninos y felinos.

DOSIFICACIÓN

En midriasis: colocar 2 gotas con intervalo de 1 hora entre cada una. Controlar una hora después. En uveítis o úlcera de córnea: colocar 1 gota cada 8/12 horas.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- En algunos pacientes la acción puede persistir de 1 a 5 días. Puede dificultar momentáneamente enfoque y respuestas fotomotoras.
- No aplicar en queratoconjuntivitis seca, ya que disminuye la producción lagrimal.
- El sabor amargo puede producir efecto sialogogo. No emplear ante glaucoma excepto secundario a uveítis.
- Hipersensibilidad al medicamento.

PRESENTACIÓN

Frasco gotero de 5ml.

Atropina

Atropine 1%



COMPOSITION

Per 100 ml:

Atropine 1.00 g

Benzalconium Chloride 0.01 g

Vehicle q.s. ad 100.00 ml

DESCRIPTION

Mydriatic. Pupil dilator.

INDICATIONS

Uveitis, keratitis, iridocyclitis, corneal ulcers.

Examination of eyes.

The treatment applies to the following species:

Cats and dogs.

DOSAGE

Mydriasis: 2 drops at 1-hour intervals.

Uveitis or corneal ulcer: 1 drop every 8 to 12 hours.

CONTRAINDICATIONS

Do not administer in case of keratoconjunctivitis sicca, since it suppresses tear production.

Do not administer in case of glaucoma.

HOW SUPPLIED:

Drop dispenser bottle containing 5 ml.