

Colirio Magnum

Gentamisina 1,4%



FÓRMULA

Gentamicina Sulfato.....1,4 g

Vehículo c.s.p.....100 ml

DESCRIPCIÓN

El Colirio Magnum es un producto formulado especialmente con un antibiótico de amplio espectro y acción bactericida. Por sus características posee acción lubricante, protegiendo la córnea de lesiones por roce y permitiendo la repitelización. Posee acción contra *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Proteus* spp., *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Aerobacter* spp. y otros agentes responsables de conjuntivitis.

INDICACIONES

Es un producto indicado para las conjuntivitis y Queratitis bacterianas sensibles a la Gentamicina o disminución de la película lagrimal. Úlceras de córnea, queratoconjuntivitis seca. Infecciones bacterianas resistentes a las concentraciones habituales de Gentamicina.

PRESENTACIÓN

Frasco gotero de 10 ml.

ESPECIES

Indicado para ser utilizado en Caninos y Felinos.

DOSIFICACIÓN

Se debe aplicar 1 - 2 gotas sobre el globo ocular, repitiendo cada 4 a 12 hs, según gravedad de la afección y criterio profesional.

CONTRAINDICACIONES

No emplear simultáneamente con antibióticos bacteriostáticos.

PRECAUCIONES

Si se emplearan líquidos para el lavado ocular previamente a la aplicación del Colirio, esperar unos minutos para evitar la dilución del fármaco.

Colirio Magnum

Gentamisin 1,4%



FORMULA

Gentamicin Sulfate..... 1.4 g

Vehicle Vehicle q.s. ad..... 100 ml

DESCRIPTION

Bactericide. Lubricant

INDICATIONS

Conjunctivitis and Keratitis caused by bacterial infection or by decreased tear production or increased tear film evaporation.

Corneal ulcer. Keratoconjunctivitis sicca (KCS). Bacterial infections resistant to usual dose of Gentamicin.

THE TREATMENT APPLIES TO THE FOLLOWING SPECIES:

Dogs and cats.

DOSAGE

Administrate 1 or 2 drops in the affected eye, every 4 to 12 hours according to the directions of the veterinarian.

CONTRAINDICATIONS

Do not administer simultaneously with bacteriostatic antibiotics.

PRECAUTIONS

If liquid is used for washing the eye before the application of Eye drops, wait a few minutes to avoid dilution of the drug. Do not use simultaneously with bacteriostatic antibiotics.

HOW SUPPLIED

Drop dispenser bottle containing 10 ml.