

## Cefalexin Plus 205

Cefalexina 18%



### DESCRIPCIÓN

Es un Antibiótico bactericida de Amplio Espectro, Cefalosporina de primera generación. Solución Inyectable por vía intramuscular o subcutánea que se absorbe rápidamente dentro de los 5 minutos y su concentración máxima en sangre se alcanza dentro de la hora de aplicado. Posee un amplio volumen de distribución, lo que garantiza su llegada al sitio de acción. Puede utilizarse en hembras preñadas. De primera elección para infecciones de piel y tejidos blandos.

### ESPECIES

Caninos y felinos.

### INDICACIONES

Enfermedad respiratoria bovina, Queratoconjuntivitis Infectiosa Bovina, Pododermatitis necrótica (Pietín).

### VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Aplicación Intramuscular o subcutánea.

## DOSIFICACIÓN

Caninos y felinos: 10 mg./Kg. de peso. Una vez por día, durante no menos de 5 días.

## TABLA DE DOSIFICACIÓN

Animal	Peso aprox.	Dosis	Ml de suspensión
Felinos	4.5 kg.	10 mg./kg.	0.25 ml.
Caninos	4.5 - 9 kg.	10 mg./kg.	0.25 - 0.5 ml.
	9 - 27 kg.		0.5 - 1.5 ml.
	27 - 54 kg.		1.5 - 3 ml.

## CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con insuficiencia renal y con sensibilidad al antibiótico.

## PRECAUCIONES

- Agitar bien el frasco antes de usar.
- Usar jeringas estériles para evitar la inactivación de la Cefalexina restante del frasco.

## PRESENTACIÓN

Frasco ampolla de 50, 100 y 250 ml.

## CONSERVACIÓN

Conservar entre 15 y 25 °C al abrigo de la luz.

## Cefalexin Plus 205

Cefalexin 18%



### ACTIVE SUBSTANCE

Cefalexin.....180 mg

Excipients q.s. .....1 ml

### SPECIES

Canine and feline

### USE

Treatment of infections of the respiratory system, urinary tract, skin, soft tissues and bone and joints diseases caused by cefalexin sensitive organisms.

### ADMINISTRATION ROUTE

Parenteral administration: intramuscular or subcutaneous injection.

**DOSAGE**

Canines and felines: 10 mg/Kg of weight. In both cases, once a day during a period of no less than 5 days. This product can be used in pregnant dogs after 5 days.

**DOSAGE TABLE**

Animal	Weight	Dose	Suspension MI
Feline	4.5 kg.	10 mg./kg.	0.25 ml.
Canine	4.5 - 9 kg.	10 mg./kg.	0.25 - 0.5 ml.
	9 - 27 kg.		0.5 - 1.5 ml.
	27 - 54 kg.		1.5 - 3 ml.

**RESTRICTION PERIOD**

Animals for slaughter: 4 days since last treatment.

Without restriction period in case of bovine milk.

**CONTRAINDICATIONS**

Do not use this product on animal with kidney failure and sensitivity to the antibiotic. Use dry syringes to avoid inactivation of the remaining cefalexin in the vial.

**HOW SUPPLIED**

50 ml vials.