

Cefatidina

Cefalexina 500mg

Ranitidina 40mg



FÓRMULA

Cefalexina..... 500 mg

Ranitidina..... 40 mg

Excipientes c.s.p..... 750 mg

DESCRIPCIÓN

La Cefalexina es un antibiótico de amplio espectro, del grupo de las cefalosporinas de 1^º generación. Se distribuye en todo el cuerpo: aparato cardiovascular, huesos y articulaciones, oído medio, tracto urinario, aparato respiratorio, piel y tejidos blandos, pero no penetra en cantidades significantes en líquido cefalorraquídeo, a menos que las estructuras anatómicas estén inflamadas.

Atraviesa la placenta (sin embargo el fármaco puede usarse sin peligro durante el embarazo) y pequeñas cantidades se encuentran en leche, es casi completamente absorbida desde el tracto gastrointestinal. Si se administra con alimentos la absorción total no es afectada. La Ranitidina es rápidamente absorbida desde el tracto gastrointestinal luego de la administración oral. La absorción no disminuye sustancialmente con la administración concomitante de alimentos o antiácidos de baja potencia, si con antiácidos de alta potencia.

INDICACIONES DE USO

Para el tratamiento de infecciones del sistema respiratorio, tracto urogenital, tracto gastrointestinal, piel y tejidos blandos, así como para enfermedades de los huesos y articulaciones.

ESPECIES

Caninos y felinos.

VIA DE ADMINISTRACIÓN

Vía Oral. En comprimidos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Se sugiere: Caninos: 1 comprimido cada 20 kg de peso. Felinos: ¼ comprimido cada 5 kg de peso. Cada 8 o 12 hs. o a criterio del profesional actuante.

CONTRAINDICACIONES

No se recomienda el uso de este producto en animales con insuficiencia renal o hepática ni en aquellos con sensibilidad al antibiótico.

No administrar concomitantemente con otros antiácidos.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

El tratamiento puede repetirse 2 o 3 veces por día hasta 5 días de acuerdo con la evolución del paciente y con el criterio profesional. En caso de piodermias superficiales se debe continuar la toma del producto durante 7 a 10 días después de desaparecidos los signos clínicos. En piodermias profundas se debe continuar con la toma del producto durante 14 a 21 días después de desaparecidos los signos clínicos. En casos de infecciones agudas la dosis puede ser administrada más frecuentemente.

PRECAUCIONES

Este medicamento debe estar fuera del alcance de los niños y conservarse entre 5 y 25 °C.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 1 blíster con 10 comprimidos de 750 mg c/u.

Cefatidina

Cephalexine 500mg

Ranitidine 40mg



FORMULA

Cephalexine..... 500 mg

Ranitidine..... 40 mg

Excipients q.s.ad..... 750 mg

PRESENTATION

1 blister with 10 tablets of 750 mg each.

SPECIES

For canine and feline.

INDICATIONS

Wide spectrum antimicrobial associated with an antiulcer a and an acid stomach inhibitor.

For the treatment of the respiratory system, urinary track, skin, gastrointestinal system, soft tissues infections as well as bones and articulations diseases.

DOSAGE

Canines: 1 tablet every 20 kg of weight

Felines: ¼ tablet every 5 kg of weight

Every 8 or 12 hs or at the discretion of the attending professional

CONTRAINDICATIONS AND WARNING

Do not administrate to animals suffering from a renal or hepatic insufficiency.

Do not administrate to animals with sensitivity to the antibiotic or to beta lactamics

The use of this product may produce agranulocytosis sporadically, heart arrythmias, excitability and emesis.

Do not take concomitantly with other antiacids.

Keep out of the reach of the children and store at a temperature between 5 and 25° C.

TREATMEN DURATION

The treatment can be repeates 2 or 3 times a day for 5 days according to the pacients evolution and according to the proffesionals judgment.

In case of superficial pyoderma gangrenosum the treatment must continue for 7 to 10 days after the clinical symptoms disappear.

In serious cases of pyoderma the treatment must continue for 14 to 21 days after the clinical symptoms desappear.

In case of acute infections the dose can be administered more frequently.