

Digitalico

Digoxina 0,05%



FÓRMULA

Digoxina..... 0,05 g

Vehículo c.s.p. 100 ml

PRESENTACIÓN

El producto viene en frasco gotero de 20 ml, listo para ser utilizado.

DESCRIPCIÓN

La digoxina es un fármaco ionotrópico positivo, cuya propiedad fundamental es aumentar la fuerza de contracción sistólica. Esta acción es muy notable, especialmente en la insuficiencia cardíaca y es directamente sobre el miocardio, gracias a esta acción se produce una reducción en el número de contracciones, un aumento del volumen minuto y un leve descenso de la presión arterial, mejorando por ende el flujo sanguíneo renal, la filtración glomerular y como consecuencia disminuye la secreción yuxtglomerular de renina de modo que disminuye la resorción renal de sodio y agua y por ende, el edema. Se promueve la diuresis. También eleva el flujo sanguíneo hepático aumentando la depuración de aldosterona y contribuye a reducir el edema. La presentación líquida del producto permite ser absorbido más rápidamente en la primera porción del intestino delgado lo cual permite una rápida acción.

INDICACIONES

Indicado para insuficiencia cardíaca por disfunción crónica del miocardio o por sobrecarga ventricular.

ESPECIES

El producto es destinado para utilizarse en caninos y felinos.

VIA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral.

DOSIS

Digitalización: 1-2 gotas por kilogramo cada 12 horas durante 2 días (equivale a 0,028-0,055 mg/kg.). Mantenimiento: 2-4 gotas cada 10 kilogramo cada 12 horas (equivale a 0,0055-0,011 mg/kg.). La dosis de digitalización debe aplicarse durante dos días, o hasta lograr síntomas de saturación. La dosis de mantenimiento es de por vida.

ADVERTENCIA

- Debe tenerse en cuenta que la hipercalcemia, la hipocalcemia y las enfermedades de la glándula tiroides, aumentan la sensibilidad del corazón a los digitálicos.
- Contraindicado en enteritis, nefritis agudas, miocarditis, bradicardia y bloqueos cardíacos.

Digitalico

Digoxin 0,05%



COMPOSITION

Per 100 ml:

Digoxin 0.050 g

Vehicle q.s. ad 100.0 ml

DESCRIPTION

Anti-arrhythmic agent.

SPECIES

Cats and dogs.

INDICATIONS

Cardiac failure caused by myocardic dysfunction or ventricular tachycardia.

DOSAGE

Heart failure or atrial arrhythmia: 0.028-0.055 mg (approximately 1-2 drops) per kilo.

Maintenance dose: 0.0055-0.011 mg (approximately 2-4 drops) every 10 kg.

CONTRAINDICATIONS

Enteritis, acute nephritis, myocarditis, bradycardia, coronary artery blockage.

HOW SUPPLIED

Box containing 1 drop-dispenser bottle, 20 ml.