

Doxipet

Antibiótico de amplio espectro



FÓRMULA

Doxiciclina (como hclato) 111 mg*

Excipientes c.s.p. 310 mg

*Equivale a 100 mg de Doxiciclina

DESCRIPCIÓN

DOXIPET es un antibiótico de amplio espectro derivado semisintético de las tetraciclinas, para uso en caninos y felinos con afecciones respiratorias, digestivas y genitourinarias.

ESPECIES

Caninos y felinos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Administración oral de 2,5 o 5 mg Doxiciclina/Kg de peso dos veces al día o 5 - 10 mg/Kg de peso una vez al día, durante 3 - 5 días en infecciones agudas y 8 - 10 días en infecciones crónicas. Es decir, medio o un comprimido de DOXIPET por cada 10 Kg. de peso una vez al día. Las dosis como la duración del tratamiento pueden ser modificadas a criterio del Médico Veterinario.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en casos de hipersensibilidad a la droga. No administrar a la madre durante las últimas 2 a 3 semanas de preñez y a los cachorros durante las primeras semanas de vida, por la posible aparición de coloración en los dientes de estos, a pesar de que la Doxiciclina por su escasa interacción con el calcio parece menos propensa a provocar este efecto.

PRESENTACIÓN

Caja por 30 y por 200 comprimidos ranurados.

PRECAUCIONES

No administrar conjuntamente con penicilinas y vitaminas del complejo B (especialmente riboflavina). No administrar conjuntamente con antiácidos que contienen aluminio, calcio, magnesio o compuestos que contienen hierro, porque disminuyen su absorción. No administrar barbitúricos, carbamazepina y fenitoína que disminuyen el tiempo de vida media de la Doxiciclina.

Conservar entre 15 y 25°C, en su envase original, en lugar seco y no expuesto a la luz solar directa.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Doxipet

Broad-spectrum antibiotic



COMPOSITION

Each tablet contains:

Doxycycline hyclate 111 mg*

Vehicle q.s. ad 310 mg

*equivalent to 100 mg doxycycline

DESCRIPTION

DOXIPET is a broad-spectrum antibiotic derived from semi-synthetic tetracyclines, for use in canines and felines with respiratory, digestive, and genitourinary conditions.

SPECIES

Dogs and cats.

DOSAGE AND DIRECTIONS FOR USE

Oral administration of 2.5 or 5 mg of doxycycline/kg of body weight twice daily or 5-10 mg/kg of body weight once daily, for 3-5 days in acute infections and 8-10 days in chronic infections. That is, half or one DOXIPET tablet per 10 kg of body weight once daily. Doses and duration of treatment may be modified at the veterinarian's discretion.

CONTRAINDICATIONS

Do not administer in cases of hypersensitivity to the drug. Do not administer to the mother during the last 2 to 3 weeks of pregnancy and to puppies during the first weeks of life, due to the possible appearance of discoloration of their teeth, although doxycycline, due to its limited interaction with calcium, seems less likely to cause this effect.

PRESENTATION

Box of 30 and 200 scored tablets.

PRECAUTIONS

Do not administer concomitantly with penicillins and B vitamins (especially riboflavin). Do not administer concomitantly with antacids containing aluminum, calcium, magnesium, or iron-containing compounds, as they decrease their absorption. Do not administer barbiturates, carbamazepine, and phenytoin, which decrease the half-life of doxycycline.

Store between 15 and 25°C, in its original packaging, in a dry place away from direct sunlight. Keep out of reach of children and pets.