



Clean Eyes

Ayuda a eliminar las manchas producidas por el lagrimeo constante

Contiene Tilosina, complementada con Vitamina A y Vitamina E.



Formulado para eliminar las manchas causadas por lágrimas en animales con epifora crónica.



También resulta útil en otras áreas pigmentadas por lamido frecuente, como patas y boca.

¡Fácil dosificación!

Se espolvorea sobre el alimento del animal

Palatable. Sabor pollo



FICHA TÉCNICA

FÓRMULA

Cada 100 g contiene:

Tilosina (como tartrato).....	8,0 g
Vitamina A Acetato.....	400.000 UI
Vitamina E Acetato.....	600 UI
Saborizante y agentes de formulación c.s.	

DESCRIPCIÓN

Polvo listo para usar. Espolvorear sobre el alimento del animal a tratar inmediatamente antes de ofrecerle la comida y asegurar la completa ingesta.

INDICACIONES

Es un producto desarrollado para eliminar las manchas antiestéticas de las lágrimas en aquellas razas de perros y gatos que la padecen (epifora crónica). Además colabora en la eliminación de las manchas de la boca y manos producidas por el lamido. Controla la dermatitis bacteriana ocasionada por el humedecimiento producido por el lagrimeo, babeo o lamido eliminando la tinción lagrimal antiestética y el mal olor en la cara de la mascota que en ocasiones se presenta. Las Vitaminas A y E refuerzan la acción del antibiótico mejorando la inmunidad, favoreciendo el crecimiento epitelial y el desarrollo del pelo, además de los efectos antioxidantes que protegen la salud del animal.

ESPECIES

Caninos y felinos.

DOSIFICACIÓN

Una cuchara de té (aprox. 2,5 gr) cada 5 kg/p.v.
 Tratamiento: En una primera etapa administrar diariamente la dosis indicada en cualquiera de las comidas hasta la desaparición de las manchas. En una segunda etapa, administrar día por medio durante un mes.
 Mantenimiento: Administrar 2 veces por semana.
 Este tratamiento es orientativo, puede ser modificado según criterio de su Médico Veterinario.

PRESENTACIONES

Pote de 50 gramos.

PRECAUCIONES

El producto es un polvo listo para usar. Espolvorear sobre el alimento del animal a tratar, inmediatamente antes de ofrecer la comida y asegurar la completa ingesta del mismo.
 El producto no es riesgoso para la salud pública o el medio ambiente. Eliminar el envase en los recipientes comunes para residuos de uso domiciliario. Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en hembras en gestación y cachorros de hasta 8 semanas. No administrar en hembras en lactación. Está contraindicado el uso en animales sensibles a tilosina u otros antibióticos macrólidos. En raras ocasiones puede provocar signos gastrointestinales leves (diarrea, anorexia). En estos casos, discontinuar el tratamiento.