Floxin 5%

Enrofloxacina 5%

FÓRMULA

Enrofloxacina ..... 5 g

Excipientes c.s.p. ..... 100 ml

DESCRIPCIÓN

Antibiótico inyectable listo para usar. La Enrofloxacina es una fluoroquinolona, antibiótico bactericida de amplio espectro.

ESPECIES

Bovinos, porcinos, caninos y felinos.

INDICACIONES

Indicado para el tratamiento y control de infecciones dérmicas, respiratorias, genitourinarias y del tracto gastrointestinal, provocadas por gérmenes gram (+), gram (-) y Micoplasmas.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Inyectable por vía intramuscular (IM) o subcutánea (SC).

DOSIFICACIÓN

Bovinos y porcinos: 0,5 a 1 ml cada 10 kg de peso cada 24 horas durante 5 días.

Caninos y felinos: 1 ml cada 10 kg de peso cada 24 horas durante 5 días.

En caso de necesidad puede extenderse el tratamiento hasta 30 días, quedando a criterio del profesional actuante.

PRESENTACIONES

Frasco ampolla de 50 y 100 ml.

PRECAUCIONES

El uso de este medicamento debe hacerse bajo un estricto control del médico veterinario dado que su uso puede causar desórdenes gastrointestinales y reacciones de hipersensibilidad. Evitar tratamientos paralelos con sales de calcio o hierro.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en hembras gestantes. No utilizar en caninos menores de un año en razas pequeñas, o de 18 meses en razas grandes, estableciéndose estos parámetros como edad en la cual se produce el cartílago epifisiario, dado que puede producir problemas en el desarrollo de huesos largos por acción erosiva sobre los cartílagos en crecimiento.

PERÍODO DE RETIRO

Deben transcurrir 28 días entre el último tratamiento y el sacrificio del animal para consumo humano. No utilizar en vacas en producción de leche cuyo destino sea para consumo humano.

CONSERVACIÓN

Conservar entre 5 y 25 ºC en lugar fresco y seco.

Floxin 5%

Enrofloxacin 5%

FORMULA

Enrofloxacin ..... 5 g.

Excipients, q.s.f. ..... 100 ml

INDICATIONS

It is indicated for the treatment and control of skin, respiratory, urinary and intestinal infections caused by gram-positive, gram-negative and mycoplasma bacteria.

TARGET SPECIES

Bovine cattle, swine, dogs and cats.

DOSAGE

Bovine cattle and swine: From 0,5 to 1 ml every 10 kg of weight every 24 hours for 5 days.

Dogs and cats: 1 ml every 10 kg of weight every 24 hours for 5 days.

If it is necessary, the treatment can be extended up to 30 days, according to the veterinarian's judgement.

HOW SUPPLIED

50 ml