

## FLOXIN

Enrofloxacin 50 mg



### FÓRMULA

Para pequeñas mascotas

Enrofloxacin.....50 mg

Excipientes c.s.p.....150 mg

### DESCRIPCIÓN

La enrofloxacin es un quimioterápico para el tratamiento y control de infecciones dérmicas, respiratorias, urinarias e intestinales.

La actividad antibiótica de la enrofloxacin se ejerce a través de su acción inhibitoria sobre la subunidad A de la ADN girasa bacteriana, impidiendo la apertura de las cadenas implicadas, lo cual lleva por mecanismos aún no dilucidados a la muerte de la bacteria. Las fluoroquinolonas poseen una completa absorción alcanzándose concentraciones máximas dentro de las 2 horas post administración. En la mayoría de las especies la distribución de las fluoroquinolonas es grande, siendo mayor que la distribución alcanzada por los betalactámicos y aminoglucósidos logrando altas concentraciones en mucosas, secreción bronquial, hígado y tracto urinario, penetrando bien en el tejido pulmonar, resultando concentraciones mayores a las séricas.

Son eliminadas por metabolismo hepático y excreción renal, son parcialmente metabolizadas en el hígado y excretadas en bilis y orina a altas concentraciones de metabolito activo. La excreción renal es variable y permite alcanzar altas concentraciones urinarias. El metabolito activo de este tipo de drogas es la Ciprofloxacina, que es la encargada de la actividad antimicrobiana, dicho metabolismo de drogas se lleva a cabo en el hígado.

## INDICACIONES

Comprimido de uso oral, para el tratamiento y control de infecciones dérmicas, respiratorias, urinarias e intestinales provocadas por gérmenes gram-positivos, gram-negativos y micoplasma. Agentes susceptibles: Escherichia coli, Salmonella spp, Klebsiella spp, Pasteurella spp, Haemophilus spp, Bordetella bronchiséptica, Staphilococcus spp, Pseudomona aeruginosa, Campylobacter spp y micoplasmas spp.

## ESPECIES

Caninos y felinos.

## DOSIFICACIÓN

Como dosis totales se sugiere: 1 comprimido cada 10 kilos. El tratamiento debe repetirse cada 12 ó 24 horas según criterio del médico veterinario actuante. Duración del tratamiento: El tratamiento debe continuarse durante 5 ó 10 días según la gravedad del caso y criterio del profesional actuante. En caso de afecciones dermatológicas puede requerirse su uso por entre 20 y 30 días.

## PRECAUCIONES DE USO

- No utilizar en hembras gestantes.
- No utilizar en caninos menores de 12 meses en razas pequeñas, o de 18 meses en razas grandes, estableciéndose estos parámetros como edad en la cual se produce el desarrollo de huesos largos por acción erosiva sobre los cartílagos en crecimiento.
- Evitar tratamientos paralelos con sales de calcio o hierro.
- El uso de este medicamento debe hacerse bajo un estricto control del médico Veterinario dado que su uso puede causar desordenes gastrointestinales y reacciones de hipersensibilidad.

## PRECAUCIONES

Como todo medicamento debe mantenerse en lugar fresco y seco a temperatura ambiente con límites de temperatura entre 5°C y 25°C. Mantener fuera del alcance de los niños.



f   [www.paraquenos.com.ar](http://www.paraquenos.com.ar)

## PRESENTACIÓN

Estuche con 20 blister por 10 comprimidos ranurados por 150 mg cada uno (Enrofloxacina 50 mg).

## FLOXIN

Enrofloxacin 50 mg



### FORMULA

Enrofloxacin..... 50 mg

Excipients q.s.ad..... 150 mg

### DESCRIPTION

Chemotherapy of oral use for the treatment and control of skin infections, respiratory, urinary and intestinal.

### INDICATIONS

Floxin is suggested for the treatment and control of dermal, urinary, respiratory and intestinal infections produced by gram positive and gram negative bacteria and mycoplasma.

Also in non-infectious inflammatory states and hypersensitivity in tumor processes.

**SPECIES**

Cattle, swine, felines, canines

**CONTRAINDICATIONS AND WARNINGS**

Do not use in pregnant females.

Do not use in canine of small breed under the age of one or under 18 months in big breeds, as it may inhibit growth of load-bearing articular cartilage by erosion damage of the growing cartilage.

**PRECAUTIONS**

This medicament use must be under the veterinary doctor strict control, it can cause gastrointestinal disorders or hypersensitivity reactions. Avoid treatments with calcium salts or iron.

**PRESENTATION**

Small animals: Box with 20 blister x 10 tablets x 150 mg each.