

Gotil Max Gatos

Imidacloprid 8,0 g

Piriproxifeno 0,8 g



FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Imidacloprid..... 8,0 g

Piriproxifeno..... 0,8 g

Agentes de formulación c.s.

DESCRIPCIÓN

La combinación de imidacloprid y piriproxifeno actúa en forma complementaria sobre los estadios adultos y larvarios, por el uso del piriproxifeno, un regulador de crecimiento de los insectos (IGRs) permite un adecuado control de pulgas e insectos.

El uso de Gotil Max Gatos una vez al mes durante todo el año combate pulgas y protege de las enfermedades transmitidas por éstas a los animales.

Las pulgas son eliminadas en menos de 12 horas, manteniendo a los animales y el ambiente libres de todos los estadios del ectoparásito (huevos, larvas, pupas y adultos), por aproximadamente un mes.

ESPECIES

Felinos.

INDICACIONES

Gotil Max Gatos se indica para la prevención y tratamiento de la infestación por pulgas del gato (*Ctenocephalides* spp). Además posee acción larvicida.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Tópica. Spot-on.

DOSIFICACIÓN

Peso vivo	Volumen de pipeta	Dosis aplicadas
Gatos de hasta 4 kg	0,5 ml	Imidacloprid: 10-20 mg/kg Piriproxifeno: 1-2 mg/kg
Gatos de 4 a 8 kg	1,0 ml	Imidacloprid: 10-20 mg/kg Piriproxifeno: 1-2 mg/kg

PRESENTACIONES

Pipeta de 0,5 ml para gatos de hasta 4 kg

Pipeta de 1,0 ml para gatos de 4 a 8 kg

PRECAUCIONES

Para obtener una elevada eficacia en gatos, se debe aplicar la totalidad del producto en la zona de la nuca, separando el pelo y apoyando la pipeta sobre la piel.

El pelaje debe estar seco en el punto de aplicación.

Puede aplicarse a hembras gestantes y lactantes.

Evitar el contacto con los ojos, boca del animal y con otros animales hasta que el pelo del mismo esté seco.

Aplicar el producto cada 35 días.

En todos los casos el intervalo de aplicación depende del grado de reinfestación del animal y del ambiente.

La duración del tratamiento queda a criterio del profesional actuante.

CONTRAINDICACIONES

El producto es de uso externo para felinos.

Contraindicado en animales que demuestren sensibilidad al principio activo.

Puede aplicarse en felinos a partir de la octava semana de vida.

Tóxico para abejas.

CONSERVACIÓN

Mantenga el envase cerrado entre 5 y 30°C, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No almacenar conjuntamente con los alimentos.

Eliminar el envase en los recipientes comunes para residuos de uso domiciliario.

Gotil Max Cats

Imidacloprid 8,0 g

Pyriproxyfen 0,8 g



FORMULA

Every 100 ml contains:

Imidacloprid.....8,0 g

Pyriproxyfen.....0,8 g

Excipients q.s.

DESCRIPTION

The combination of imidacloprid and pyriproxyfen acts in a supplementary way on the adult and larval stages, by the use of pyriproxyfen, an insect growth regulator (IGRs) that allows an adequate control of fleas and insects.

Using Gotil Max Cats once a month throughout the year fights fleas and protects animals from diseases transmitted by them.

Fleas are eliminated in less than 12 hours, keeping the animals and the environment free of all stages of the ectoparasite (eggs, larvae, pupae and adults), for approximately one month.

TARGET SPECIES

Cats.

INDICATIONS

Gotil Max Cats is indicated for the prevention and treatment of flea infestation on cats. (*Ctenocephalides* spp). It also has a larvicidal effect.

ROUTES OF ADMINISTRATION

Topical. Spot-on. Pipette

DOSAGE

Body weight	Pipette volume	Applied doses
Cats up to 4 kg.	0.5 ml	Imidacloprid: 10-20 mg/kg Pyriproxyfen 1-2 mg/kg
Cats from 4 to 8 kg.	1.0 ml	Imidacloprid: 10-20 mg/kg Pyriproxyfen 1-2 mg/kg

PRESENTATIONS

Pipette 0,5 ml for cats up to 4 kg.

Pipette 1,0 ml for cats from 4 to 8 kg.

WARNINGS

To obtain high efficiency in cats, the entire product should be applied at the back of the neck, separating the hair and resting the pipette on the skin.

The fur must be dry for the application.

It can be applied to pregnant and lactating female cats.

Avoid contact with the animal's eyes, mouth, and other animals until its hair is dry.

Apply the product every 35 days.

In all cases, the application interval depends on the degree of reinfestation of the animal and the environment.

The duration of the treatment depends on the veterinarian.

CONTRAINDICATIONS

This product is for external use, only for cats.

It is contraindicated in animals that show sensitivity to the active substance.

It can be applied to cats from the eighth week of life.

Toxic to bees.

STORAGE

Keep the container closed, in a cool dry place, sheltered from light. The storage temperature should be between 5 and 30°C.

Keep out of reach of children

Do not store with food.

Throw the container away in the rubbish bin.