

Medroxyl

Acetato de Medroxiprogesterona



FÓRMULA

Medroxiprogesterona acetato..... 50 mg

Agentes de formulación c.s.p..... 1 ml

DESCRIPCIÓN

Medroxyl es una suspensión hormonal inyectable anticonceptiva y anovulatoria para caninos y felinos hembras en anestro.

Además está indicada en el tratamiento de dermatitis y alopecia psicógena felina, como coadyuvante en el tratamiento de animales con comportamiento agresivo y en casos de aborto recurrente secundario a deficiencia de progesterona. La rápida resuspensión del producto hace más fácil su utilización y asegura una correcta dosificación garantizando el efecto deseado en los animales tratados por vía subcutánea o intramuscular.

ESPECIES

Canina y felina.

INDICACIONES Y DOSIFICACIÓN

Prevención del estro en hembras caninas y felinas: Administrar 1 ml por animal vía subcutánea (corresponde a administrar 50 mg totales de acetato de medroxiprogesterona). Una sola dosis es suficiente como para evitar la aparición del estro por 6 meses. En caso de que la aparición del estro se quiera seguir interrumpiendo, el intervalo entre dosis deberá ser de 5 a 6 meses. Como coadyuvante en el tratamiento de comportamiento agresivo: Caninos: Administrar 10 mg/kg de peso por vía intramuscular o subcutánea cada 4 meses durante 1 año. (Este tratamiento funciona mejor cuanto es combinado con educación adiestramiento del canino). Felinos: a) Iniciar con una dosis de 2 ml (corresponde a 100 mg totales) cada 30 días y luego reducir la dosis a la mitad (1 ml / 50 mg totales) o, 1/3 (0,7 ml / 35 mg totales) durante 1 año. b) Administrar 10 -20 mg/kg de peso por vía subcutánea cada 4 meses durante 1 año. Tratamiento de dermatitis y alopecia psicógena felina: Administrar 75 a 150 mg totales por vía subcutánea o intramuscular cada 2 a 3 meses con una duración de tratamiento variable según criterio del profesional actuante de acuerdo al resultado del tratamiento. Tratamiento de aborto recurrente secundario a deficiencia de progesterona: Administrar 1-2 mg/kg de peso por vía intramuscular cada 7 días y hasta 7-10 días antes de la fecha de parto.

EFFECTOS ADVERSOS

Debido a los efectos adversos que posee (aumento del apetito y/o sed, letargo, depresión suprarrenal, cambios en las mamas, incluida la hiperplasia, la producción de leche y los tumores, diabetes mellitus y piómetra) siempre se debe evaluar la posibilidad de evitar la aplicación de progestágenos y dejar reservados dicho uso para el caso de: vacaciones o viajes, época de caza, cuando el estado de salud no permite una ovariectomía, cuando la gestación y/o el parto signifique un riesgo para el animal.

Puede causar alopecia local con despigmentación en el sitio de inoculación, por este motivo se recomienda utilizar una zona poco visible como la cara interna del muslo. Deben observarse las normas de asepsia propias para productos inyectables.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

No utilizar en hembra prepúberes y en hembras que no estén en anestro.

No utilizar en hembras preñadas salvo la indicación "Tratamiento de aborto recurrente secundario a deficiencia de progesterona".

No utilizar en animales con tumores mamarios hormono-dependientes y en animales con malformaciones genitales.

En el caso de utilizar como coadyuvante en el tratamiento de comportamiento agresivo, tener en cuenta los efectos adversos ya que la dosis empleada en este tratamiento es elevada.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla conteniendo 1, 3 y 5 ml.

Medroxyl

Medroxyprogesterone Acetate



FORMULA

Medroxyprogesterone acetate 50 mg

Excipients, q.s.f 1 ml

DESCRIPTION

Medroxyl is an injectable contraceptive and anovulatory hormonal suspension for female dogs and cats during the anestrus time.

It is also indicated in the treatment of feline psychogenic dermatitis and alopecia, as an adjunct in the treatment of animals with aggressive behavior and in cases of recurrent abortion secondary to progesterone deficiency. The rapid resuspension of the product makes its use easier and ensures a correct dosage, guaranteeing the desired effect in animals treated subcutaneously or intramuscularly.

TARGET SPECIES

Dogs and cats.

INDICATIONS AND DOSAGE

Prevention of rut in female dogs and cats: Administer 1 ml subcutaneously (It corresponds to administer 50 mg of Medroxyprogesterone acetate). Only one dose is enough to avoid the rut taking place during 6 months. If the rut is to be interrupted further, the interval between doses should be from 5 to 6 months. As an adjunct in the treatment of aggressive behavior: Dogs: Administer 10 mg/kg intramuscularly or subcutaneously every 4 months for 1 year. (This treatment works better when it is combined with dog training education). Cats: a) Start with a dose of 2 ml (It corresponds to 100 mg total) every 30 days and then reduce the dose by half (1 ml / 50 mg total) or, 1/3 (0.7 ml / 35 mg total) for 1 year. b) Administer 10-20 mg / kg of body weight subcutaneously every 4 months for 1 year.

Dermatitis and feline psychogenic alopecia treatment: Administer 75 to 150 mg subcutaneously or intramuscularly every 2 to 3 months with a variable duration of the treatment according to the veterinarian and the treatment result. Treatment of recurrent abortion secondary to progesterone deficiency: Administer 1- 2 mg/kg intramuscularly every 7 days and up to 7-10 days before the labour date.

SIDE EFFECTS

Due to its side effects (increased appetite and/or thirst, lethargy, adrenal insufficiency, changes in the breasts, including hyperplasia, milk production and tumors, diabetes mellitus and pyometra), the possibility of avoiding the application of progestogens should always be evaluated and such use should be reserved in case of: holidays or trips, hunting season, when the state of health does not allow an ovariectomy, when gestation and / or labour represents a risk for the animal.

It can cause local alopecia with depigmentation at the inoculation site, for this reason it is recommended to use an inconspicuous area such as the inner side of the thigh. The proper asepsis regulations for injectable products must be observed.

CONTRAINDICATIONS AND RESTRICTIONS ON USE

Do not use in prepubescent female animals or in those that are not in the anestrus cycle.

Do not use in pregnant females except for the indication "Treatment of recurrent abortion secondary to progesterone deficiency".

Do not use in animals with hormone-dependent mammary tumors and in animals with genital malformations.

In the case of using the product in the treatment of aggressive behavior, take into account the side effects since the dose used in this treatment is high.

PRESENTATION

Ampoule vial containing 1, 3 and 5 ml.