

## TIOCTIN Proagro

Ácido Tióctico 0,5%



### FÓRMULA

Ácido Tióctico.....0.5 g  
Agentes de formulación.....100 ml

### DESCRIPCIÓN

El Ácido Tióctico, también conocido como ácido lipoico, es un compuesto con función protectora en hígado. Actúa como co-enzima en numerosas reacciones bioquímicas del metabolismo de los azúcares, grasas y proteínas. Una de ellas es el proceso llamado glicolisis (responsable de la reconversión de azúcar sanguínea a energía).

También actúa neutralizando radicales libres interviniendo en procesos de detoxificación.

### ESPECIES

Bovinos, Ovinos, Equinos, Porcinos, Caninos y Felinos.

### INDICACIONES

Se sugiere el uso de Tioctin como hepatoprotector, desintoxicante, antioxidante, hipoglucemiante, energizante, digestivo y estimulante de la función hepática. Utilizado en casos de patologías hepáticas primarias y secundarias, Ej: Insuficiencias hepáticas, hepatitis agudas y crónicas, hígado graso, cirrosis, cetosis, etc. También usada en el caso de indigestiones, fotosensibilización, intoxicaciones medicamentosas o por metales pesados (Plomo, mercurio y arsénico, etc.) Actúa como protector renal, favoreciendo la vascularización de las nefronas en pacientes con insuficiencia renal aguda y/o crónica, y pacientes bajo tratamiento antineoplásico. También puede utilizarse para acelerar la recuperación de pacientes bajo anestesia general.

### VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Subcutánea (SC), intramuscular (IM) o endovenosa (EV), según criterio médico y gravedad de cada caso.

### DOSIFICACIÓN

Bovinos y Equinos: 10 ml cada 100 kg de peso.

Ovinos y Porcinos: 5 ml cada 50 kg de peso.

Caninos y Felinos: 2 a 3 ml cada 5 kg de peso.

Se recomienda una aplicación cada 24 hs. La duración del tratamiento queda a criterio del profesional actuante, no obstante no deberá ser menor a 5 días y podrá extenderse hasta 10 días.

**PRESENTACIÓN**

Frasco ampolla de 50 ml.

**PRECAUCIONES**

En casos aislados, se puede obtener un descenso del nivel de glucosa en sangre, causado por un mejor aprovechamiento de la misma.

Agite antes de usar y aplique con material limpio y seco siguiendo procedimientos asépticos.

**CONTRAINDICACIONES**

No administrar en animales sensibles al principio activo.

**PERÍODO DE RETIRO**

No presenta.

**CONSERVACIÓN**

Conservar entre 5 y 30°C en lugar fresco y seco.