

Pulgar Comprimidos

A base de Spinosad



COMPOSICIÓN

Cada comprimido de 400 mg contiene:

Spinosad..... 150,0 mg

Palatabilizante y agentes de formulación c.s.

Cada comprimido de 800 mg contiene:

Spinosad..... 300,0 mg

Palatabilizante y agentes de formulación c.s.

Cada comprimido de 1600 mg contiene:

Spinosad..... 600,0 mg

Palatabilizante y agentes de formulación c.s.

INDICACIONES

Pulgar Comprimidos es un pulguicida sistémico de acción rápida a base de Spinosad, con gran poder de volteo y actividad residual por 5 semanas.

Útil en el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides spp.*), pudiendo ser parte en el control de la dermatitis alérgica a la picadura de pulgas. (DAPP).

El spinosad es un insecticida de origen natural producido por la fermentación de una bacteria actinomiceto llamado *Saccharopolyspora spinosa*.

— DESDE 1969 —

PROAGRO
Laboratorio Veterinario

www.proagrolab.com.ar
info@proagrolab.com.ar | 0800 555 0008 (Arg)

Agentes etiologicos susceptibles:

Pulgas: Ctenocephalides canis y Ctenocephalides felis

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Peso vivo	Comprimido	Dosis aplicadas
Perro "Mini" 2,5-5 kg	1 comprimido de 400 mg (150 mg spinosad)	Corresponde a administrar 30-60 mg/kg de peso vivo
Perro "Pequeño" 5.1-10 kg	1 comprimido de 800 mg (300 mg spinosad)	Corresponde a administrar 30-60 mg/kg de peso vivo
Perro "Mediano" 10.1-20 kg	1 comprimido de 1600 mg (600 mg spinosad)	Corresponde a administrar 30-60 mg/kg de peso vivo
Perro "Grande" 20.1-40 kg	2 comprimidos de 1600 mg (1200 mg spinosad)	Corresponde a administrar 30-60 mg/kg de peso vivo
Perro "Gigante" 40.1-80 kg	4 comprimidos de 1600 mg (2400 mg spinosad)	Corresponde a administrar 30-60 mg/kg de peso vivo

Comprimidos palatables de administración oral.

Administrar directamente en forma voluntaria o enmascarado en el alimento. En caso de no ingerir voluntariamente, administrar por vía oral asegurando la deglución del comprimido.

Administrar junto con los alimentos o inmediatamente después.

Administrar cada 35 días. La duración del tratamiento queda a criterio del profesional actuante, pudiendo ser esta en forma continua para prevenir infestaciones por pulgas.

RECOMENDACIONES

No utilizar en perros menores a 14 semanas.

Las dosis superiores a las marcadas pueden disminuir el umbral de convulsiones en perros epilépticos.

No utilizar en caso de conocida hipersensibilidad al principio activo.

No está demostrada la inocuidad en hembras gestantes, en lactación y cachorros menores a 14 semanas. En caso de administrar en estas categorías, que sea bajo la supervisión del médico veterinario.

Pulgar comprimidos no debe administrarse junto a la ivermectina a altas dosis, pues puede aumentar la toxicidad de la ivermectina.

Puede causar vómitos, disminución del apetito, letargo o diarrea. En el caso de que el vómito suceda inmediatamente posterior a la administración, la dosis deberá repetirse.

En caso de hipersensibilidad o reacción alérgica se deberá tratar en forma sintomática y no volver a repetir el tratamiento.

Al disminuir el umbral de convulsiones en perros epilépticos, se deberá tomar precauciones en estos casos. Consultar al médico veterinario.

Administrar con la comida ya que esta aumenta la biodisponibilidad.

El spinosad no tiene un antídoto específico.

El tratamiento de intoxicaciones es sintomático y de apoyo.

En caso de ingesta accidental consultar inmediatamente al médico.

Llevar el prospecto o envase.

Centro nacional de intoxicaciones (Argentina): 0800-333-0160

PRESENTACIONES:

Perro "Mini" de 2,5 a 5 Kg - 1 comprimido de 400 mg (150 mg de spinosad)

Perro "Pequeño" de 5,1 a 10 Kg - 1 comprimido de 800 mg (300 mg de spinosad)

Perro "Mediano" de 10,1 a 20 Kg - 1 comprimido de 1600 mg (600 mg de spinosad)

Perro "Grande" de 20,1 a 40 Kg - 2 comprimidos de 1600 mg (1200 mg de spinosad)

Perro "Gigante" de 40,1 a 80 Kg - 4 comprimidos de 1600 mg (2400 mg de spinosad)

Hospitalaria de comprimidos de 400 mg (150 mg de spinosad)

Hospitalaria de comprimidos de 800 mg (300 mg de spinosad)

Hospitalaria de comprimidos de 1600 mg (600 mg de spinosad)

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado en un lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Los envases vacíos no constituyen un factor de riesgo para la salud pública, animal y del medio ambiente. Eliminar en los recipientes comunes para residuos de uso domiciliario.

Producto inflamable. No arrojar el envase al fuego y evitar su exposición a temperaturas mayores de 50 °C.

El spinosad es poco tóxico para peces, aves y fauna salvaje en general. Se degrada rápidamente en el suelo y en agua. Es fotodegradable y biodegradable por microorganismos aeróbicos. No se da bioacumulación.

Conservar entre 15 - 30°C al abrigo de la luz.

Pulgar Tablets

Based on Spinosad



Composition

Every tablet of 400mg contains:

Spinosad..... 150.0 mg

Palability and excipients q.s.f.

Every tablet of 800mg contains:

Spinosad..... 300.0 mg

Palability and excipients q.s.f.

Every tablet of 1600mg contains:

Spinosad..... 600.0 mg

Palability and excipients q.s.f.

INDICATIONS

Pulgar Tablets is a fast-acting systemic flea killer based on Spinosad, with great power dump and residual activity for 5 weeks.

It is useful in the treatment and prevention of flea infestations (*Ctenocephalides spp.*), and it may be part of the control of allergic dermatitis to flea bites. (DAPP).

Spinosad is a naturally occurring insecticide produced by the fermentation of an actinomycete bacterium called *Saccharopolyspora spinosa*.

Susceptible Etiologic Agents:

Flea: Ctenocephalides canis and Ctenocephalides felis

DOSAGE AND INSTRUCTIONS FOR USE

Body weight	Tablet	Applied doses
“Mini” Dog 2.5- 5 kg	1 tablet of 400 mg (150 mg spinosad)	Administer 30-60 mg/kg of body weight
“Small” Dog 5.1- 10 kg	1 tablet of 800 mg (300 mg spinosad)	Administer 30-60 mg/kg of body weight
“Medium-sized” Dog 10.1- 20 kg	1 tablet of 1600 mg (600 mg spinosad)	Administer 30-60 mg/kg of body weight
“Big” Dog 20.1- 40 kg	2 tablets of 1600 mg (1200 mg spinosad)	Administer 30-60 mg/kg of body weight
“Giant” Dog 40.1- 80 kg	4 tablets of 1600 mg (2400 mg spinosad)	Administer 30-60 mg/kg of body weight

Palatable tablets for oral administration.

It should be administered voluntarily or inside the food. In case of not administering voluntarily, do it orally ensuring the swallowing of the tablet.

It should be administered with food or immediately after.

It should be done every 35 days. The duration of the treatment is at the discretion of the acting professional, and it may be continuous to prevent flea infestations.

RECOMMENDATION

Do not administer in dogs under 14 weeks.

Higher than marked doses may lower the seizure threshold in epileptic dogs.

Do not administer in case of hypersensitive to the active ingredient.

The innocuousness in pregnant females, in lactation and puppies under 14 weeks has not been demonstrated. In case of administering in these categories, let it be under the supervision of the veterinarian.

Pulgar tablets should not be administered together with ivermectin at high doses, as it may increase the toxicity of ivermectin.

It may cause vomiting, decreased appetite, lethargy, or diarrhea. In the event that vomiting occurs immediately after administration, the dose should be repeated.

In case of hypersensitivity or allergic reaction, it should be treated symptomatically and the treatment should not be repeated.

By lowering the seizure threshold in epileptic dogs, precautions should be taken in these cases. Consult the veterinarian.

It should be administered with food to increase bioavailability.

Spinosad does not have a specific antidote.

Poisoning treatment is symptomatic and supportive.

In case of accidental ingestion, consult a doctor immediately.

Take the information leaflet or container.

National Poison Centre (Argentina): 0800- 333 – 0160

PRESENTATIONS

“Mini” Dog from 2,5 to 5 kg - 1 tablet of 400 mg (150 mg spinosad)

“Small” Dog from 5,1 to 10 kg - 1 tablet of 800 mg (300 mg spinosad)

“Medium-sized” Dog from 10,1 to 20 kg - 1 tablet of 1600 mg (600 mg spinosad)

“Big” Dog from 20,1 to 40 kg - 2 tablets of 1600 mg (1200 mg spinosad)

“Giant” Dog from 40,1 a 80 kg - 4 tablets of 1600 mg (2400 mg spinosad)

Tablets of 400 mg (150 mg spinosad)

Tablets of 800 mg (300 mg spinosad)

Tablets of 1600 mg (600 mg spinosad)

WARNINGS

Keep the container closed, in a cool dry place, sheltered from light.

Keep this medicine out of reach of children and pets.

Empty containers do not constitute a risk factor for public, animal and environmental health. Throw the container away in the rubbish bin.

Flammable substance do not burn the container or expose it to temperatures over 50 °C.

Spinosad is slightly toxic to fish, birds and wildlife in general. It degrades rapidly in soil and in water. It is photodegradable and biodegradable by aerobic microorganisms. Bioaccumulation does not take place.

It should be stored between 15 - 30°C, sheltered from light.