

Bicherón 50NF

Cipermetrina 20%



FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Cipermetrina..... 20 g

Excipientes c.s.p..... 100 ml

DESCRIPCIÓN

Insecticida rural concentrado. Control inmediato y efecto residual sobre insectos.

Bicherón 50 NF esta formulado a base de cipermetrina para el control de insectos en instalaciones rurales en general y jardines.

ESPECIES

Bovinos, ovinos, porcinos, caprinos, equinos y caninos.

INDICACIONES

Control de insectos que atacan al ganado y animales domésticos: garrapatas, mosca doméstica, mosca brava, arañuelas, tábanos, mosquitos, piojos, pulgas y otros insectos de parques, galpones de aves, establos, boxes, tambos, cabañas, porquerizas e instalaciones rurales en general.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Tópica en fina pulverización, tratando de cubrir sin mojarlos, mediante el uso de bombas rociadoras, pulverizadores, nebulizadores o fumigadores.

DOSIFICACIÓN

Se recomienda aplicar una fina niebla de la emulsión cubriendo la superficie a tratar.

En el ambiente esto representa aproximadamente 1 litro de emulsión cada 5 m².

Sobre animales la dosis orientativa sería: Bovinos y equinos: 2 a 5 L. Ovinos y caprinos: 2 L, dependiendo del largo del pelo o lana del animal a tratar. Porcinos: 1 a 2 L. Caninos: 100 a 200 ml. Según tamaño.

PREPARACIÓN: Diluir en agua 1:1000 (1 ml por litro de agua), agitando suavemente.

Al agregarse produce una emulsión rápida y estable. Se recomienda usar la emulsión dentro de las 24 horas de su preparación.

PRESENTACIONES

Frascos goteros de 50 y 100 ml.

PRECAUCIONES

A pesar de la baja toxicidad del producto es recomendable el uso de guantes y máscara durante la manipulación del mismo. En espacios abiertos la aplicación debe realizarse a favor del viento. En espacios cerrados, comenzar por los sectores más alejados de la puerta de salida. No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto. No almacenar ni transportar junto con alimentos. No arrojar a cursos de agua, lagos o lagunas, dado su potencial de intoxicación para las especies poiquilothermas (animales de sangre fría). No pulverizar en ambientes habitados por animales de sangre fría. No es recomendable su aplicación en cachorros. En caso de ingestión accidental, no provocar el vómito ni administrar alimentos grasos (leche), tratar con carbón activado o purgantes salinos. En caso de intoxicación concurrir al médico.

CONTRAINDICACIONES

Se recomienda no aplicar el producto a caninos de razas orientales, pues produce síndromes respiratorios y neurológicos de difícil tratamiento.

PERÍODO DE RETIRO

Deben transcurrir seis días entre el último día de tratamiento y el sacrificio del animal para consumo humano.

Deben transcurrir seis horas entre el último tratamiento y el destino de leche para consumo humano.

CONSERVACIÓN

Conservar entre 5 y 25 °C.

Bicherón 50NF

Cypermethrin 20%



FORMULA

Every 100 ml contains:

Cypermethrin..... 20 g

Excipients q.s.f 100 ml

DESCRIPTION

Rural insecticide concentrated. Immediate control and residual effect on insects.

Bicherón 50 NF is formulated based on cypermethrin for the control of insects in rural facilities and gardens.

TARGET SPECIES

Bovine cattle, ovine, swine, equine, goats, and dogs.

INDICATIONS

Control of insects that attack livestock and domestic animals: ticks, house flies, wild flies, spider mites, horseflies, mosquitoes, lice, fleas and other insects from the parks, poultry houses, stables, boxes, dairy farms, cabins, pigsty and rural facilities in general.

ROUTES OF ADMINISTRATION

Topical in a fine spray, trying to cover without wetting them, through the use of spray pumps, sprayers, nebulizers or fumigators.

DOSAGE

It is recommended to apply a fine mist of the emulsion covering the surface to be treated.

In the environment this represents approximately 1 liter of emulsion every 5 m².

On animals the indicative dose would be: Bovine cattle and Equine: 2 to 5 liters of emulsion. Ovine and Goats: 2 liters of emulsion, depending on the length of the hair or wool of the animal to be treated. Swine: 1 to 2 liters of emulsion. Dogs: 100 to 200 ml liters of emulsion. According to size.

PREPARATION: Dilute in water 1: 1000 (1 ml per liter of water), shaking gently.

When added, it produces a fast and stable emulsion. It is recommended to use the emulsion within 24 hours of its preparation.

PRESENTATIONS

Dropper containing 50 and 100 ml.

WARNINGS

Despite the low toxicity of the product, the use of gloves and a mask is recommended when handling it. In open spaces the application must be done downwind. In enclosed spaces, start with the sectors furthest from the exit door. Do not eat, drink or smoke during the process. Do not store or transport together with food. Do not dump into water courses, lakes or lagoons, given their potential for poisoning poikilothermal species (cold-blooded animals). Do not spray in environments inhabited by cold-blooded animals. Its application in puppies is not recommended. In case of accidental ingestion, do not induce vomiting or administer fatty foods (milk), treat with activated charcoal or saline purgatives. In case of poisoning, go to the doctor.

CONTRAINDICATIONS

It is recommended not to apply the product to canines of oriental breeds, as it produces respiratory and neurological syndromes that are difficult to treat.

WITHDRAWAL PERIOD

Treated animals should not be slaughtered for human consumption for a period of 6 days after treatment.

Treated cows should not be milked for human consumption for at least 6 hours after treatment.

STORAGE

The storage temperature should be between 5 and 25 °C.