

Gotil Spot On

Fipronil 6,7 g



FÓRMULA

Fipronil.....6,7 g
Exipientes c.s.p....100,0 ml

INDICACIONES

Gotil está indicado para el tratamiento y prevención de infestaciones por garrapatas, pulgas y piojos, además de ser un eficaz complemento en el tratamiento de la dermatitis alérgica por pulgas.

ESPECIES

Caninos

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Tópica. Spot-on.

DOSIFICACIÓN

Peso vivo	Volumen de pipeta
Perro de 2 a 10 kg	1 ml
Perro de 11 a 20 kg	2 ml
Perro de 21 a 40 kg	4 ml
Perro de 41 a 60 kg	6 ml

MODO DE EMPLEO

Volcar el contenido de la pipeta sobre la piel del animal, en el cuello entre la nuca y el dorso. Separar el pelo antes de aplicar, verificando que el mismo este seco.

Para control de garrapatas la aplicación del producto deberá hacerse cada 45 días, para el control de pulgas se aplicará el producto cada 60 días, en el control de piojos, se deberá hacer una aplicación cada 60 a 90 días.

En todos los casos el intervalo de aplicación depende del grado de reinfestación del animal y del ambiente.

Si el producto es usado para el tratamiento de dermatitis alérgica a la picadura de pulgas, se debe aplicar una pipeta cada 30 días, con la precaución de tratar a los demás caninos que cohabiten con el animal enfermo, además de un efectivo control ambiental.

PRECAUCIONES

Como todo producto tóxico no se debe almacenar cerca de los alimentos o utensilios de cocina.

Gotil Spot On no constituye un factor de riesgo ambiental, por lo que la eliminación de las pipetas debe llevarse a cabo de igual forma que un residuo común, evitando verter el producto en cursos de agua.

CONTRAINDICACIONES Y RECOMENDACIONES DE USO

El producto es sólo de uso externo para caninos.

No utilizar en caninos menores de 10 semanas de edad, ni menores a 2 kg de peso.

Evitar el contacto con las manos al aplicar el producto.

Lavarse las manos con abundante agua y jabón después de aplicar el producto.

No fumar ni comer durante su aplicación.

Evitar el contacto con el animal tratado hasta que el pelo del mismo esté seco.

Evitar empapar el pelo del animal en exceso.

No bañar al animal 48 horas antes al tratamiento ni 48 horas después del mismo.

Intoxicación: En caso de intoxicación se debe llamar al médico y provocar el vómito. No se conoce antídoto específico para el activo y los síntomas de intoxicación se pueden manifestar como incoordinación, excitación, temblor o sedación.

Conservar entre 5 y 30 °C, en lugar seco y al abrigo de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800–3330160.