

Helmintex Suspensión Cachorros


**Febantel + Pamoato de Pirantel
+ Toltrazuril**

**Fórmula completa y efectiva para prevención
y tratamientos de parásitos internos que
incluyen Nematodos: *Toxocara spp.*, *Trichuris spp.*,
Ancylostoma spp., y Coccidios.**



**Una sola
toma**



FICHA TÉCNICA

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Febantel..... 1.50 g

Pamoato de Pirantel..... 1.44 g

Toltrazuril..... 1.00 g

Agentes de formulación c.s.

INDICACIONES: uso en caninos y felinos para la prevención y tratamientos
de parásitos internos que incluyen nematodos y Coccidios.

Posee actividad contra:

Caninos: *Toxocara spp.*, *Trichuris spp.*, *Ancylostoma spp.* y *Coccidios*.

Felinos: *Toxocara spp.*, *Ancylostoma caninum* y *Cystoisospora spp.*

ESPECIES: caninos y felinos.

ADMINISTRACIÓN: la vía de administración es oral con jeringa dosificadora.

PRESENTACIONES

Envases de 15 y 150 ml.

DOSIFICACIÓN

Administrar 1 ml de producto
por kilo de peso vivo (1 ml/kg). Corresponde a administrar 15 mg/kg
de peso de febantel y 14,4 mg/kg de peso de pirantel y 10 mg de Toltrazuril.

INTERVALO ENTRE DOSIS: Corresponde una sola dosis.

Caninos: en infestaciones masivas se sugiere repetir a las 24 horas y desparasitar nuevamente a los 15 y 21 días. Repetir a los 30 y 60 días si se diagnosticó *Trichuris*. **Felinos:** Repetir a los 14 días para *Toxocara* y *Ancylostoma*.

La dosificación puede modificarse según recomendaciones del profesional veterinario actuante.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

No utilizar en caso de conocida hipersensibilidad a algunos de los componentes del producto. No utilizar en cachorros menores de 15 días.

No utilizar en hembras preñadas ya que se carece de trabajos que avalen su uso.

PRECAUCIONES DE USO

Agitar bien antes de usar.

Administrar con jeringa dosificadora preferentemente desde lateral de la boca y con suavidad.

También puede ser administrado en el alimento.