

Helmintex Suspensión Cachorros

Antiparasitario interno palatable



FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Febantel..... 1.50 g

Pamoato de Pirantel..... 1.44 g

Toltrazuril..... 1.00 g

Agentes de formulación c.s.

INDICACIONES

Uso en caninos para la prevención y tratamientos de parásitos internos que incluyen nematodos y Coccidios.

Posee actividad contra: Ancylostoma spp., Toxocara spp., Trichuris spp. y Coccidios.

ESPECIES

Caninos.

ADMINISTRACIÓN

Vía oral con jeringa dosificadora.

DOSIFICACIÓN

Caninos: Administrar 1 ml de producto por kilo de peso vivo (1 ml/kg).

Corresponde a administrar 15 mg/kg de peso de febantel y 14.4 mg/kg de peso de pirantel y 10 mg de Toltrazuril.

Intervalo entre dosis

Corresponde una sola dosis.

En infestaciones masivas se sugiere repetir a las 24 horas y desparasitar nuevamente a los 15 y 21 días.

Repetir a los 30 y 60 días si se diagnosticó Trichuris.

La dosificación puede modificarse según recomendaciones del profesional veterinario actuante.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

No utilizar en caso de conocida hipersensibilidad a algunos de los componentes del producto.

No utilizar en cachorros menores de 15 días.

No utilizar en hembras preñadas ya que se carece de trabajos que avalen su uso.

PRECAUCIONES DE USO

Agitar bien antes de usar.

Administrar con jeringa dosificadora preferentemente desde lateral de la boca y con suavidad.

También puede ser administrado en el alimento.

PRESENTACIONES

Envase de 15, 75 y 150 ml.